



Než budete přípravek EURneffy potřebovat, plně se s ním seznámte, včetně toho, kdy a jak jej používat.

EURneffy nosní sprej



Podle tohoto návodu postupujte pouze tehdy, když jste připraveni přípravek použít.


A



Vyjměte přípravek EURneffy nosní sprej z obalu.

Obal tahem otevřete a vyjměte přípravek EURneffy nosní sprej.

B




Nosní sprej držte podle obrázku.

Držte nosní sprej palcem na spodní části pístu a prsty na obou stranách trysky.

- **Nevytahujte píst ani na něj netlačte.**
- **Sprej netestujte ani nevystříkujte předem. Každý nosní sprej obsahuje pouze jednu dávku.**


C




Vložte špičku nosního spreje do nosní dírky, dokud se prsty nedotknete nosu.

Držte trysku namířenou přímo do nosu směrem k čelu. Nosní sprej nenaklánějte k vnitřní nebo vnější stěně nosu.

D



Pevně zatlačte na píst, dokud nezapadne a nevystříkne do nosní dírky.



Nosní sprej nenaklánějte k vnitřní nebo vnější stěně nosu.




Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc.

Okamžitě vyhledejte rychlou lékařskou pomoc za účelem pečlivého sledování anafylaktické příhody a pro případ, že bude nutná další léčba.



Sledujte příznaky pacienta.



Pokud se příznaky po přibližně 10 minutách nadále zhoršují nebo se znovu objeví nebo pokud došlo k chybě v dávkování, podejte druhou dávku pomocí nového nosního spreje přípravku EURneffy do **STEJNÉ** nosní dírky jako první dávku a vyhledejte rychlou lékařskou pomoc.

V případě potřeby si můžete lehnout se zvednutýma nohama. Pokud Vám to působí dýchací potíže, posaďte se. Pacienty v bezvědomí je třeba uložit na bok do stabilizované polohy. Pokud příznaky neodezní, máte pokud možno zůstat s další osobou, dokud nepříjde lékařská pomoc.



ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm, Dánsko