

EURneffy®

(nosní sprej s adrenalinem)

Jak poznat závažnou alergickou reakci

Použijte EURneffy® okamžitě při prvních známkách závažné alergické reakce po vystavení alergenu, mezi příznaky patří:

- Svědění pokožky
- Kožní vyrážka (podobná kopřivce)
- Zarudnutí
- Otok rtů, hrdla, jazyka, rukou a nohou
- Sípání
- Chraptění
- Dušnost
- Žaludeční nevolnost
- Zvracení
- Žaludeční křeče
- Ztráta vědomí
- Obavy
- Zrychlený srdeční tep
- Záchvat
- Průjem (řidká stolice)
- Ztráta kontroly nad močovým měchýřem

U malých dětí může být obtížné příznaky rozpoznat. Další informace najdete v příbalové informaci. Přípravek EURneffy vždy užívejte podle pokynů lékaře či zdravotní sestry.



S POUŽITÍM NEVÁHEJTE,
závažnost příznaků se může
rychle změnit.

Zajistěte, abyste vy sami, vaše dítě, rodina, pečující osoby, spolupracovníci a učitelé věděli, kdy a jak EURneffy® použít.



Přípravek EURneffy je k použití pro dospělé a děti od 4 let ve dvou koncentracích:

1 mg pro pacienty s hmotností 15–30 kg a
2 mg pro pacienty s hmotností 30 kg a více.

Skladování a zacházení

Každý jednotlivý nosní sprej EURneffy obsahuje jednu dávku adrenalinu (epinefrinu) a je zabalen v blistru spolu s návodem k použití.

Vždy s sebou mějte 2 balení
EURneffy® pro případ, že
budete potřebovat 2. dávku.



Přípravek EURneffy® nevyžaduje zvláštní způsob skladování. Pokud dojde omylem ke zmrznutí nosního spreje, nebude fungovat. Nechte sprej alespoň hodinu rozmraznout.

Nepoužívejte ho v případě, že je jeho obsah stále zmrzlý, nebo úplně neroztál. Zmrznutí nemá vliv na trvanlivost výrobku.



Pravidelně kontrolujte dobu
použitelnosti a vyměňte
prostředek EURneffy®
před jejím uplynutím.

Návod na správné použití pro pacienty a pečující osoby


V tomto návodu najdete informace, co máte dělat v případě závažné alergické reakce nebo anafylaxe. S návodem by se měli seznámit nejen pacienti, ale i pečující osoby, aby dokázali rozpoznat příznaky alergické reakce a věděli, jak bezpečně a správně podat nosní sprej EURneffy®.



1. Uchopení

Držte nosní sprej tak jako na obrázku. Držte nosní sprej palcem na spodní části pístu a prsty na obou stranách trysky.

Píst NETAHEJTE ani na něj NETLAČTE. Sprej NETESTUJTE ani NEVYSTŘIKUJTE předem, protože každý nosní sprej obsahuje pouze 1 dávku.



2. Umístění

Vložte špičku nosního spreje do nosní dírky, dokud se prsty nedotknou nosu. Držte trysku namířenou přímo do nosu směrem k čelu.



3. Zmáčknutí

Pevně zatlačte na píst, dokud nezapadne a nevystříkne do nosní dírky.

Sprej NENAKLÁNĚJTE k vnitřní nebo vnější stěně nosu.

Po použití spreje EURneffy®

Okamžitě vyhledejte rychlou lékařskou pomoc (155 nebo 112), protože se vaše anafylaktická reakce musí monitorovat, a také pro případ, že budete potřebovat další pomoc. Pokud nevládnete zavolat sami, požádejte o to někoho jiného.

Při použití přípravku EURneffy®

Pokud je to nezbytné, mohou pacienti ležet se zvednutýma nohama. Pokud mají potíže s dechem, posadí se. Pacienty se ztrátou vědomí položíme na bok do stabilizované polohy. Pokud příznaky neustanou, měli byste, pokud je to možné do příjezdu lékaře zůstat pod dohledem jiné osoby.

Monitorování příznaků pacienta

Pokud příznaky přetrvávají, zhoršují se nebo se po 10 minutách vrátí nebo pokud došlo k chybnému podání, použijte druhý nosní sprej EURneffy® a vstříkněte druhou dávku do stejné nosní dírky a vyhledejte rychlou lékařskou pomoc.



Co je přípravek EURneffy®?

EURneffy® je nosní adrenalinový sprej pro dospělé a děti od 4 let s tělesnou hmotností nejméně 15 kg určený pro nouzovou léčbu závažných alergických reakcí včetně anafylaxe (náhlá závažná a někdy život ohrožující alergická reakce) v důsledku hmyzího štípnutí nebo bodnutí, potravin, léků a jiných alergenů (látek vyvolávajících alergii) a dále idiopatické anafylaxe (příčina anafylaxe není známa) nebo anafylaxe vyvolané fyzickou námahou.

Instruktažní materiály k přípravku EURneffy® včetně příbalové informace a pokynů k použití najdete online na www.EURneffy.eu

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Týká se to i kterýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou v příbalové informaci uvedeny. Nežádoucí účinky můžete nahlásit přímo pomocí národního systému hlášení. Podrobnosti o hlášení najdete na:

sukl.gov.cz/nezadouciciucinky

Adresa pro zasílání je
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10,
email: farmakovigilance@sukl.gov.cz

**Použijte EURneffy®,
jakmile zaznamenáte
příznaky závažné
alergické reakce.**